

Adecto F

No. de registro: Q-0970-017 | USO VETERINARIO | Solución inyectable
Registros sanitarios: GT: MV-4708



Fórmula

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina 1 g
Clorsulón 10 g
Vehículo c.b.p 100 mL



Indicaciones

ADECTO F Está indicado para el tratamiento de parásitos externos e internos como nemátodos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos en sus fases larvianas y adultas; tremátodos hepáticos como la Fasciola spp en etapa adulta, además de ectoparásitos como piojos, ácaros de la sarna que afectan a bovinos (carne), ovinos y caprinos.



Dosis

Aplicar 1 mL/50 kg de peso corporal (equivale a 0.2 mg de ivermectina por kg de peso corporal y 2 mg de clorsulón por kg de peso corporal), para el tratamiento de trematodos hepáticos, se recomienda su uso en duelas adultas a las 12 o 14 semanas después de la infección a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Subcutánea.



Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.



Presentaciones

50 mL, 100 mL y 500 mL.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No usar en hembras productoras de leche.



Almacenamiento

- Protéjase de la luz solar directa.
- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 a 30 °C.
- Por su toxicidad, una vez utilizado evite desecharlos en mantos acuíferos, incinere o entierre el envase o sobrantes.



Advertencias

- Evitar la aplicación conjunta con medicamentos que causan depresión del sistema nervioso.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



**INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**