

Admicin 5%

No. DE REGISTRO Q-0970-014 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-4719 NI: MV-11060 HN: MV-16347 PA: MV-6186



Fórmula

Cada 1 mL contiene:

Oxitetraciclina base..... 50 mg.
Vehículo c.b.p 1 mL.



Indicaciones

Es un antibiótico indicado en infecciones causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, micoplasma y rickettsias, sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: anaplasmosis, neumonías bacterianas, pasteurelosis, mastitis, metritis, diarreas, leptospirosis, clostridiasis, artritis infecciosa, actinobacilosis, antrax, listeriosis y micoplasmosis que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos no destinados para consumo humano, ovinos, caprinos; en caninos y felinos para neumonía, bronquitis, pleuresía, peritonitis y como terapia de apoyo en moquillo canino.



Dosis

- **Bovinos (carne y leche), equinos no destinados para consumo humano, ovinos y caprinos:** 1 a 2 ml/10 kg de peso corporal (equivale a 5-10 mg de oxitetraciclina por kilogramo de peso corporal), cada 12 a 24 horas, durante 3 a 5 días.
- **Caninos y felinos:** 1 ml/5 kg (equivale a 2.5 mg de oxitetraciclina por kilogramo de peso corporal), cada 12 horas, durante 3 a 5 días.



Vía de administración

Intramuscular profunda.



Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente no superior a 28 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Presentaciones

20 mL, 100 mL y 500 mL.



Advertencias

- Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta.
- No aplicar en animales en crecimiento.
- No aplicar más de 15 ml en un solo sitio de inyección.
- En ovinos y caprinos: no aplicar más de 5 ml en un solo sitio de aplicación.
- Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- Contraindicado en animales hipersensibles a la fórmula.
- No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris pardusco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio.
- No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y Penicilina G. Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal.



Tiempo de retiro

- No utilizar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.
- No destinar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 96 horas después de la última aplicación.
- No utilizar en equinos destinados para el consumo humano.



**INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**