

Adquin 15%

No. DE REGISTRO Q-0970-002 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-3719 NI: MV-10338 HN: PF-5749 PA: RF-7628-16 SV: VE2017065302



Fórmula

Cada 100 mL contiene:

Enrofloxacin 15 g.
Vehículo c.b.p. 100 mL.



Indicaciones

ADQUIN 15% actúa eficazmente contra bacterias tanto Gram positivas, como Gram negativas causantes de infecciones respiratorias, digestivas, genitourinarias, de piel, músculo y hueso; Gabarro, Actinobacilosis, Piometra, Leptospirosis, así como Micoplasmosis en bovinos (carne y leche), ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Dosis

- **Dosis convencional:** Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos: 1 mL / 30 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 3 a 7 días.
- **Dosis única:** Bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos: 3 mL / 60 kg de peso corporal (equivalente a 7.5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal), repetir a las 72 horas en caso de ser necesario.
- **Caninos y felinos:** 1 mL / 30 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso corporal). A criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular, intravenosa o subcutánea.



Especie

Bovinos (carne y leche), caprinos, ovinos, caninos y felinos.



Presentaciones

20 mL, 50 mL y 250 mL.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco, entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar este producto por la vía intramamaria.
- No administrar en caninos menores de 1 año y felinos menores de 8 meses o en etapa de desarrollo.
- No utilizar conjuntamente con Cloranfenicol, Tetraciclinas, Rifampicina, Teofilina, Analgésicos no esteroideos y/o cafeína, ya que ocurre antagonismo.
- No aplicar más de 15 ml en el sitio de aplicación.



Tiempo de retiro

- No administrar este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No utilizar la leche para consumo o para la fabricación de derivados lácteos hasta 4 días después de la última aplicación.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.