

Calfodex

FUERTE

No. de registro: Q-0970-004 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MV-4693 NI: MV-10849 HN: MV-1-5993 PA: RF-8340-18 SV: MV-0045092024



Fórmula

Cada 100 mL contiene:

| | |
|---------------------------------|---------|
| Borogluconato de calcio | 26 g |
| Dextrosa | 26 g |
| Borogluconato de magnesio | 8 g |
| Fósforo elemental | 0,500 g |
| Vehículo c.b.p. | 100 mL |



Indicaciones

Está indicado para el tratamiento de la hipocalcemia (fiebre de leche) y acetonemia, pareasias, hipocalcemia, raquitismo, osteoporosis y otras manifestaciones por deficiencia de calcio, fósforo, magnesio y glucosa que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Dosis

Bovinos (carne y leche): 500 mL.
Equinos: 250 a 500 mL.
Ovinos y caprinos: 50 a 125 mL.
Caninos: 10 a 40 mL.
Felinos: 5 a 15 mL.

- En caso de ser necesario, repetir la dosis de 2 a 6 horas posteriores, a criterio del Médico Veterinario.
- Se puede administrar simultáneamente por vía intravenosa y vía intramuscular.

Fiebre de leche: aplicar de 250 a 500 ml durante 1 a 3 días antes del parto, como preventivo.



Vía de administración

Intravenosa lenta o intramuscular.



Especie

Bovinos, Equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Presentaciones

500 mL.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche el envase por medio de la incineración.




Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar por vía intramuscular más de 15 ml. en la zona de aplicación.



**INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**