

CefalineRTU

No. de registro: Q-0970-031 | USO VETERINARIO | Suspensión inyectable.

Registros sanitarios: GT: MV-4722 NI: MV-10341 HN: MV-14853 PA: RF-7624-16 SV: MV-0032042025



Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Ceftiofur base
(como Ceftiofur clorhidrato)..... 5 g
Vehículo c.b.p. 100 ml



Indicaciones

CEFALINE RTU está indicado para el tratamiento de las enfermedades causadas por bacterias susceptibles al Ceftiofur. Bovinos: enfermedad respiratoria causada por: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus somnus*. Necrobacilosis interdigital o gabarro: *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melanogenicus*. Mastitis: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. uberis*, *E. coli*. Metritis: *E. coli*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*.



Dosis

Bovinos carne y leche: 1 a 2 ml / 50 kg de peso corporal (equivalente a 1 - 2 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 3 a 5 días.



Vía de administración

Intramuscular y/o subcutánea.



Especie

Bovinos (carne y leche).



Presentaciones

100 ml y 250 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco entre 15 y 30°C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración



Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- La administración prolongada del producto puede dar como resultado la sensibilización.
- Evite el contacto directo con la piel, ojos, boca y ropa.
- En caso de exposición ocular accidental, lave con abundante agua durante 15 minutos.
- Agítese bien antes de usarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 3 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- Cero días de retiro en leche.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.