

FlunidX

No. de registro: Q-0970-036 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.

Registros sanitarios: GT: MV-999 NI: MV-12761 HN: MV-15338 PA: MV-7035 SV: VE2018075446



Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Flunixin base (como Meglumina de Flunixin) 5.5 mg
Vehículo c.b.p. 100 ml



Indicaciones

Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético auxiliar en padecimientos que cursen procesos inflamatorios agudos, estados febriles, dolor visceral, alteraciones musculoesquelético y coadyuvante en el choque endotóxico por mastitis en bovinos (carne y leche), equinos y caninos.



Dosis

- Bovinos (carne y leche): 1.1 a 2.2 mg/kg de peso corporal (equivalente de 1 a 2 mL/50 kg de peso corporal), cada 12 horas, durante 3 a 5 días.
- Equinos: 1.1 mg/kg de peso corporal (equivalente a 1 mL/50 kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 a 5 días.
- Caninos: 1 mg/kg de peso corporal (equivalente a 0.5 mL/25 kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 días.



Vía de administración

Intramuscular profunda o intravenosa lenta.



Especie

Bovinos (carne y leche), Equinos y Caninos.



Presentaciones

50 ml, 100 ml y 250 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- La inyección intraarterial en equinos debe ser evitada ya que puede presentar incoordinación, hiperventilación, estimulación del SNC (histeria) y debilidad muscular.
- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- La administración prolongada del producto puede ocasionar irritación y ulceración gástrica.



Contraindicaciones

- No aplicar en animales en estado de deshidratación.
- No aplicar en animales con insuficiencia renal y/o hepática.
- No administrar en animales con discrasias sanguíneas.
- No aplicar en animales con lesiones en la mucosa gastrointestinal.
- No administrar conjuntamente con cualquier fármaco que sea potencialmente nefrotóxico.
- No usar este producto en equinos destinados para consumo humano.



Tiempo de retiro

- En bovinos no usar este producto 7 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

