

Seleer 34

No. DE REGISTRO Q-0970-097 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-291 NI: MV-16060 HN: MV-07686



Fórmula

Cada 1 ml contiene:

Selenito de sodio (Equivalente a 5 mg de selenio) 10.95 mg
Vitamina E (Equivalente a 68 UI de acetato de D-alfa tocoferol) 50 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml



Indicaciones

Está indicado para el tratamiento o la profilaxis de la deficiencia de selenio y vitamina E, como causantes de enfermedad del músculo blanco y en trastornos reproductivos, problemas de retención placentaria, metritis y quistes, ya que estas enfermedades pueden afectar la fertilidad aumentando los días abiertos.



Dosis

- **Bovinos adultos y novillos:** 1 ml/50 kg de peso (equivalente a 0.1 mg de Selenio, 1.36 UI de acetato de D-alfa tocoferol por kg de peso) en el empadre, 21 días antes del parto, al parto, al día 30 y 90 post parto a criterio del Médico Veterinario.
- **Becerras:** 1 ml/90 kg al destete (equivalente a 0.05 mg de Selenio, 0.68 UI de acetato de D-alfa tocoferol por kg de peso) a criterio del Médico Veterinario.
- **Equinos:** 1 ml/90 kg de peso (Equivalente a 0.05 mg de Selenio, 0.68 UI de acetato de D-alfa tocoferol por kg de peso). Se recomienda en yeguas 21 días antes del parto y al parto a criterio del Médico Veterinario.



Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.



Especie

Bovinos (carne y leche) y equinos.



Presentaciones

100 y 250 ml.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Administrar este producto únicamente en las especies aprobadas.
- Debido a que el selenio puede ser muy tóxico, los productos que lo contienen deben ser utilizados con prudencia.
- Los signos de toxicidad del selenio pueden variar según la especie: depresión, ataxia, disnea y diarrea.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar en animales hipersensibles a los componentes de la fórmula.
- No administrar en caso de tener una dieta muy alta en selenio u otros productos que lo contengan.



Tiempo de retiro

- Bovinos: No se administre este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No utilizar este producto en equinos destinados al consumo humano.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.