

Trimeler²⁴

No. DE REGISTRO Q-0970-043 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-4717 NI: MV-10165 HN: MV-15143 PA: MV-7497



Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Sulfametoxazol	20 g
Trimetoprim	4 g
Vehículo c.b.p.	100 ml



Indicaciones

Está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas agudas y crónicas que afectan al aparato respiratorio, digestivo, genitourinario y dermatológico causadas por bacterias como: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E. coli*, *Actinomyces spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Klebsiella spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Pasteurella spp.*, *Enterobacter aerogenes*, *Haemophilus influenzae* y *Corynebacterium spp.*, algunos hongos (*Chlamydia*, *actinomycetos*); y coccidias (*Eimeria spp.*, *Isospora spp.*), que afecta a los bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Dosis

Administrar 1 ml/15 kg de peso corporal (Equivalente a 2.7 mg/kg de Trimetoprim y 13.3 mg/kg de Sulfametoxazol) Cada 24 h durante 5 a 7 días.



Vía de administración

Intramuscular, intravenosa lenta* y subcutánea.

*La administración por vía intravenosa debe ser lenta a temperatura corporal.



Presentaciones

30 y 100 ml.



Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.



Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco, entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- La cristalización del producto por bajas temperaturas puede ser revertida mediante un calentamiento suave.
- Deseche por medio de la incineración.



Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Antídoto: Antihistamínico.
- Incrementar el consumo de agua durante el tratamiento.
- En caninos puede presentar queratoconjuntivitis seca en tratamientos prolongados.
- Las diluciones intravenosas con dextrosa al 5% se deben administrar dentro de 2 o 6 horas.
- La solución no debe utilizarse si está turbio o contiene un precipitado.
- La solución intravenosa no se debe mezclar con otros medicamentos o soluciones.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Contraindicaciones

- No administrar en animales con hipersensibilidad a las sulfamidas.
- No utilizar en animales con insuficiencia renal.



Tiempo de retiro

- No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 5 días después de la última aplicación.
- No usar en equinos para consumo humano.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.