AMOXILER 50
SUSPENSIÓN

No. de registro: Q-0970-076 | USO VETERINARIO | Polvo para suspensión oral
Registros sanitarios: GT: MV-4712 NI: MV-11782 HN: MV-16186 PA: MV-8666 SV: MV-0099112024

Fórmula

Cada 1 ml contiene:
Amoxicilina trihidrato ..... 50 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Indicaciones

Amoxiler 50 Suspensión está indicada en el tratamiento en infecciones del tracto digestivo, tracto urogenital, vías respiratorias superiores e inferiores, nasofaringe, piel, tejidos blandos y como tratamiento terapéutico durante procedimientos odontológicos, así como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina que afectan a caninos y felinos.

Dosis

1 ml/5 kg de peso corporal (equivale a 10 mg de amoxicilina por kg de peso corporal). Cada 8 a 12 horas, durante 5 a 7 días.

Modo de preparación

Adicionar agua fría, previamente hervida, hasta la marca indicada. Agitar vigorosamente hasta obtener una suspensión homogénea.

Vía de administración

Oral.

Especie

Caninos y felinos.

Presentaciones

Frasco con polvo para reconstituir suspensión de 50 ml y jeringa dosificadora.

Almacenamiento

-Conserve en lugar fresco y seco a temperatura entre 15 a 30 °C sin preparar el producto.
-Una vez hecha la mezcla, conserve en refrigeración entre 2 a 8 °C durante 7 días.
-Protéjase de la luz solar directa.
-Deseche el empaque por medio de la incineración.

Advertencias

-Agítese antes de usar.
-Pueden presentar reacción de sensibilidad como: simple urticaria a shock anafiláctico, discrasias hemáticas y colitis.
-Pueden causar efectos gastrointestinales como anorexia, vómito y diarrea.
-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

-No administrar a animales con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
-No administrar en animales con septicemia, choque u otra enfermedad grave que pueda retrasar la absorción gastrointestinal del medicamento.
-No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas como tetraciclinas, cloranfenicol y eritromicina.
-No administrar simultáneamente con salicilatos, fenilbutazona, sulfonamidas y otros ácidos débiles.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595