Tylogant 28

No. DE REGISTRO Q-0970-075 | USO VETERINARIO | Solución Inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-4714 NI: MV-11882 HN: MV-16526 PA: MV-8806

Fórmula

Cada 1 ml contienen:
Tilosina base (como tartrato) ..... 200 mg
Gentamicina base (como sulfato) ..... 80 mg
Vehículo c.b.p ..... 1 ml

Indicaciones

Esta indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la combinación de Tilosina y Gentamicina, como: *Mycoplasmas: M. hyosinoviae, M. hyorhinis, M. hyopneumoniae, M. agalactiae;* Gram positivos: *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp.;* Gram negativos: *Campylobacter coli, Escherichia coli, Neisseria spp., Spherophorus necrophorus, Actinobacilus spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Klebsiela pneumoniae, Enterobacter aerogenes*; que afectan a los bovinos (carne y leche), ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y aves de producción de carne y de combate.

Vía de administración

Intramuscular profunda y oral (aves).

Especie

Bovinos (carne y leche), ovinos (carne), caprinos (carne y leche) y aves de producción de carne y de combate.

- **Bovinos (carne y leche), ovinos (carne) y caprinos (carne y leche):** 1 mL/20 kg de peso corporal (equivale a 10 mg de Tilosina tartrato y 4 mg de Gentamicina sulfato por kg de peso corporal), cada 24 horas durante 3 a 5 días.
- **Aves (carne y de combate)**: 2.5 mL/litro de agua para tratar 10 kg de aves (equivale a 0.5 mg/mL de Tilosina tartrato y 0.2 mg/mL de Gentamicina sulfato en agua de bebida para tratar 100 g de peso en aves), cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Presentaciones

20, 100 y 250 mL.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

Advertencias

- El uso de este producto puede causar reacciones anafilácticas; antídoto: epinefrina.
- Su uso no está recomendado en equinos y caninos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

- No utilizar en animales con insuficiencia renal.

Tiempo de retiro

- No usar este producto 30 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 5 días después de la última aplicación.
- No utilizar este producto 5 días antes del sacrificio de las aves destinadas para consumo humano.
- No usar este producto en aves productoras de huevo para consumo humano.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595

Adler