Adecto 1%

No. de registro: Q-0970-016 | USO VETERINARIO | Solución inyectable
Registros sanitarios: GT: MV-4707 NI: MV-11063 HN: MV-14838 PA: MV-6183 SV: MV-1235

Fórmula

Cada 100 mL contiene:
Ivermectina ..... 1 g
Vehículo c.b.p ..... 100 mL

Indicaciones

Adecto 1% está indicado en parasitosis externas e internas tales como parasitosis gastrointestinales y pulmonares, tanto sobre las formas adultas como los estados larvarios. BOVINOS: **Nemátodos gastrointestinales:** *Haemonchus placei, Ostertagia lyrata, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomum.* **Nemátodos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus, Parafilaria bovicola. Thelazia spp.* (gusano ocular) **Larvas de mosca:** *Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.* **Piojos:** *Linognathus vituli, Linognathus pedalis, Haematopinus eurysternus, Damalinia bovis* (Piojos penetrantes). **Ácaros:** *Psoroptes ovis var. bovis, Sarcoptes bovis, Chorioptes spp.*
OVINOS Y CAPRINOS: **Nemátodos gastrointestinales:** *Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Ostertagia circumcinta, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia curticei Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus Oesophagostomum columbianum, Oesophagostomum venulosum, Chabertia ovina Trichuris ovis, Gaigeria pachys celis* **Nemátodos pulmonares:** *Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens* **Larvas nasales:** *Oestrus ovis* **Ácaros:** *Psoroptes communis var. ovis, Psorergates ovis, Sarcoptes scabiei.*

Dosis

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne): 1 mL/50 kg de peso corporal (equivale a 200 mcg de ivermectina por kg de peso corporal) dosis única a criterio del médico veterinario.

Vía de administración

Subcutánea.

Especie

Bovinos (carne), ovinos y caprinos (carne).

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Presentaciones

10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

Tiempo de retiro

-No usar este producto 28 días antes del sacrificio de bovinos (carne), caprinos (carne) y ovinos destinados para consumo humano.
-No se administre este producto en bovinos y caprinos en producción de leche que se destina al consumo humano.

Almacenamiento

-Consérvese en un lugar fresco y seco.
-Protéjase de la luz solar directa.
-Debido a la toxicidad de la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y residuos deberán desecharse en forma segura por medio de la incineración o enterrándolos.

Advertencias

-Evitar la aplicación conjunta con medicamentos que causan depresión del sistema nervioso.
-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
-Este producto no debe ser utilizado para el tratamiento por infestaciones de garrapatas *Boophilus spp.*

Contraindicaciones

-No aplicar por vía intramuscular o intravenosa.
-No aplicar más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación.
-No existe un antídoto específico: tratamiento sintomático y de sostén.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595