Adecto
ADULTO
Tabletas

No. de registro: Q-0970-044 | USO VETERINARIO | Tabletas
Registros sanitarios: GT: MV-4704 NI: MV-12028 HN: MV-15145 PA: MV-7033 Rep. Dom.: 14041

Fórmula

Cada tableta contiene:

Ivermectina	1 mg
Prazicuantel	50 mg
Pamoato de pirantel	150 mg
Fenbendazol	150 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de las parasitosis causadas por nemátodos, céstodos, protozooarios, en estados larvarios y huevos, que afectan a caninos y felinos.

Agentes: **Céstodos:** *Dipylidium caninum, Taenia pisciformis, Taenia taeniaeformis, Echinococcus granulosus.* **Nemátodos:** *Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Ancylostoma tubaeforme, Dirofilaria immitis. Capillaria aerophila, Capillaria plica, Capillaria feliscati, Capillaria linearis, Capillaria hepática, Aelurostrongylus abstrusus.* **Protozoario**: *Giardia spp.*

Dosis

Caninos y felinos: 1 tableta para 10 kg de peso corporal (equivale a 100 mcg/kg de ivermectina, 5 mg/kg de Prazicuantel, 15 mg/kg de Pamoato de pirantel y 15 mg/kg de Fenbendazol).

Repetir a los 15 días para romper con el ciclo biológico del parásito. Para el control de Giardiasis se recomienda una toma cada 24 horas durante 2 o 3 días, a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración

Oral.

Presentaciones

Exhibidor con 16 carteras, con 4 tabletas cada una (64 tabletas).

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Especie

Caninos y felinos.

Almacenamiento

-Consérvese en un lugar fresco y seco.
-Protéjase de la luz solar directa.
-Debido a la toxicidad de las ivermectinas evite eliminar el empaque y los residuos en mantos acuíferos, deberán desecharse en forma segura, enterrándolos o incinerándolos.

Advertencias

-En ocasiones puede producir diarrea, depresión, incoordinación, salivación, tremores musculares, debilidad muscular y vómito.
-Dosificar siempre con relación al peso.
-Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

-No utilizar en animales menores a un 1 kg de peso.
-No se recomienda su uso de en razas de perros susceptibles a los componentes de la fórmula como son: Collie, Border Collie, Antiguo Pastor Inglés, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Pastor Australiano miniatura, Pastor de Shetland y Whippet de pelo largo por la mutación del gen MDR1 (Gen recesivo que permite que algunos medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica).
-No se administre en perros y gatos menores de 6 semanas de edad.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595

Adler