Calciler MAX

No. de registro: Q-0970-041 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-4690 NI: MV-11982 HN: MV-14860 PA: MV-8651

Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Gluconato de calcio	26 g
Dextrosa anhídra	8 g
Ácido bórico	5.2 g
Hipofosfito de magnesio	1.46 g
Nicotinamida (Vit.B3)	100 mg
Tiamina (Vit.B1)	0.24 mg
Piridoxina (Vit. B6)	20 mg
Riboflavina (Vit. B2)	12 mg
DL- Isoleucina	8 mg
L-Arginina HCL	8 mg
L-Histidina HCL	5.6 mg
L-Metionina	4.8 mg
D-Pantenol	1.2 mg
Vehículo c.b.p	100 ml

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento de los trastornos metabólicos del calcio y minerales, que afectan a:

- **Bovinos (carne y leche):** raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), tetania de los pastos, estados de estrés, acetonemia (toxemia de la preñez), osteomalacia y calambres.
- **Equinos no destinados para consumo humano:** raquitismo, hipocalcemia (tetania hipocalcemia), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.
- **Ovinos (carne):** raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia (toxemia de la preñez), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.
- **Caprinos (carne y leche):** raquitismo, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia (toxemia de la preñez), tetania de los pastos, estados de estrés y calambres.
- **Caninos:** raquitismo, hipocalcemia (tetania puerperal, Eclampsia), osteomalacia y calambres.

Dosis

- **Bovinos (carne y leche) y Equinos:** 200 a 500 ml.
- **Ovinos (carne) y Caprinos (carne y leche):** 15 a 30 ml.
- **Caninos:** 5 a 10 ml.

Vía de administración

Intravenosa lenta, intramuscular profunda o subcutánea.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Especie

Bovinos (carne y leche), Equinos, Ovinos (carne), Caprinos (carne y leche) y Caninos

Presentaciones

Envase de 500 ml.

Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

Advertencias

- Por vía intravenosa, deberá administrarse lentamente 100 ml (15 a 20 minutos).
- La dosis puede ser dividida, una mitad por vía IV y la otra mitad por vía IM o SC.
- Todas las sales por vía IV pueden favorecer la presencia de shock o bloqueo cardiaco, en particular en equinos; use la vía IM en soluciones más diluidas, caliente el producto a la temperatura corporal.
- Revise la frecuencia cardiaca antes de la aplicación, 70 por minuto como máximo durante la aplicación de cualquier calcio.
- En caso de presentarse arritmia cardiaca, sudación, lagrimeo, polipnea y espasmos musculares, suspenda inmediatamente la aplicación y continúe posteriormente en forma más lenta cuando el animal haya recuperado la normalidad de sus constantes fisiológicas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

- No administrar en combinación con Sulfas.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595

Adler