FlunidX

No. de registro: Q-0970-036 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-999 NI: MV-12761 HN: MV-15338 PA: MV-7035 SV: MV-1718

Fórmula

Cada 100 ml contienen:
Flunixin base (como Meglumina de Flunixin) ..... 5.5 mg
Vehículo c.b.p. ..... 100 ml

Indicaciones

Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético auxiliar en padecimientos que cursen procesos inflamatorios agudos, estados febriles, dolor visceral, alteraciones musculoesquelético y coadyuvante en el choque endotóxico por mastitis en bovinos (carne y leche), equinos y caninos.

Dosis

-Bovinos (carne y leche): 1.1 a 2.2 mg/kg de peso corporal (equivale de 1 a 2 mL/50 kg de peso corporal), cada 12 horas, durante 3 a 5 días.
-Equinos: 1.1 mg/kg de peso corporal (equivale a 1 mL/50 kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 a 5 días.
-Caninos: 1 mg/kg de peso corporal (equivale a 0.5 mL/25 kg de peso corporal), cada 24 horas, durante 3 días.

Vía de administración

Intramuscular profunda o intravenosa lenta.

Especie

Bovinos (carne y leche), Equinos y Caninos.

Presentaciones

50, 100, 250 mL.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Almacenamiento

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Deseche por medio de la incineración.

Advertencias

- La inyección intraarterial en equinos debe ser evitada ya que puede presentar incoordinación, hiperventilación, estimulación del SNC (histeria) y debilidad muscular.
- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- La administración prolongada del producto puede ocasionar irritación y ulceración gástrica.

Contraindicaciones

- No aplicar en animales en estado de deshidratación.
- No aplicar en animales con insuficiencia renal y/o hepática.
- No administrar en animales con discrasias sanguíneas.
- No aplicar en animales con lesiones en la mucosa gastrointestinal.
- No administrar conjuntamente con cualquier fármaco que sea potencialmente nefrotóxico.
- No usar este producto en equinos destinados para consumo humano.

Tiempo de retiro

- En bovinos no usar este producto 7 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595

Adler