Neodip50

No. de registro: Q-0970-019 | USO VETERINARIO | Solución inyectable.
Registros sanitarios: GT: MV-4701 NI: MV-10854 HN: MV-14855 PA: RF-8335-18 SV: VE2017095339

Fórmula

Cada 1 ml contiene:
Dipirona ..... 500 mg.
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml.

Indicaciones

Está indicado como antiinflamatorio, antiespasmódico en la distensión abdominal aguda, como antipirético en las afecciones de curso febril de origen infeccioso o no, y como analgésico en el dolor intenso y en los procesos inflamatorios, que afectan a los bovinos (carne y leche), equinos no destinados para consumo humano, ovinos, caprinos caninos y felinos.

Dosis

-Bovinos (carne y leche): 1 mL/12.5-25 kg de peso corporal (equivale a 20-40 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal);
-Equinos: 1 mL/10-25 kg de peso corporal (equivale a 20-50 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal);
-Ovinos y Caprinos: 1 mL/10 kg de peso corporal (equivale a 50 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal);
-Caninos: 0.5 mL/10 kg de peso corporal (equivale a 25 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal). Cada 8 a 12 horas, durante 3 a 5 días, a criterio del Médico Veterinario.
-Felinos: 0.5 mL/10 kg de peso corporal (equivale a 25 mg de dipirona por kilogramo de peso corporal) cada 24 horas, durante 3 a 5 días, a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración

Intramuscular o intravenosa.

Presentaciones

20 mL, 100 mL y 250 mL.

Especie

Bovinos (carne y leche), equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

USO EXCLUSIVO PARA EL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Almacenamiento

-Consérvese en un lugar fresco y seco entre 15 y 30 °C.
-Protéjase de la luz solar directa.
-Deseche por medio de la incineración.

Advertencias

- Al igual que cualquier fármaco puede presentar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Contraindicaciones

- No se administre en animales con insuficiencia renal y/o hepática aguda o crónica.
- No administrar este producto a animales con discrasia sanguínea.
- No emplear Fenilbutazona o Barbitúricos a la vez con Dipirona.

Tiempo de retiro

-No usar este producto 35 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.
-No usar en equinos destinados a consumo humano.
-No usar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 7 días después de la última aplicación.



® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel: (33) 3133-8595